TESTUDO RADIATA.

Printed by C. Hullmandel.

J. & C. Vincent, del. & Lith. Edinr.

TESTUDO RADIATA. *Shaw.*

Testâ hemisphæricâ, scutis planis, subimbricato-sulcatis, nigris, luteo-radiatis, areolis subgibbosis; scuto nuchali lato. Pedibus posticis squamis binis corneis, magnis, solidis, postice armatis.

Testudo sculpta major. Grew. Mus. Reg. p. 37. t. 36. fig. 1.

Testudo Cist. Daud. Rept. ii. p. 371. t. xxvi.

Testudo radiata. Shaw. Gen. Zool. iii. p. 22. t. 3. Grey. Syn. Rept. p. 58.

Habitat in Insula Madagascar.

Mus. nostr.

Descriptio. *Caput* squamis magnis tectum, nigro, luteo et rubro variegatum. *Mandibulæ* serrato-denticulatæ. *Pedes anteriores* squamis imbricatis tecti, fusci, luteo et rubro maculati. *Pedes posteriores* fusci, squamis rotundatis defensi; *calces* squamis binis corneis, solidis, susceuti. *Ungues* breves. *Cauda* mediocris. *Testa* alte fornicata, globosa; margine antice et postice dentato, lateribus integris. *Scuta dorsalia* nigra, luteo radiata, radiis marginem versus dilatatis, plana, lata, subimbricato-sulcata: *vertebralia* areolis vix elevatis; primum pentagonum, angulo antico truncato; secundum, tertium et quartum hexagona; quintum subquadratum; *costalia* lata, plana, areolis subgibbosis; primum et quintum trapezoidea; secundum et tertium pentagona: *marginalia* alta, lata, areolis inferioribus radiis luteis sabellinis, ambitu expansis; anteriora angulato-porrecta, lateralia quadrata, verticalia; postica quatuor posteriora prominentia dentato-insulata. *Scutum analis* latum, porrectum, apice bidentatum: *anedia* latum, verticale, bicarinata. *Sternum* luteo et nigro radiato-tessellatum, planum vel leviter concavum, latum, lobo antico angulato, postico bifido, emarginato. *Scuta gularia* rhomboidea, porrecta: *humeralia* pentagona, areolis ad angulum anticoexterum posita: *pectoralia* inferiorum angusta, extrorsum dilatata: *abdominalia* maxima, quadrata, areolis globosis: *femoralia* quadrata: *analia* transverse rhomboidea.